

MARIMEX

bazénová chemie

CHLOR KOMPLEX

CHLOROVÉ TABLETY VELKÉ

1
REGULACE pH

2
DEZINFKECE

3
ŘASY

4
VLOČKOVÁNÍ

5v1

1,6 kg



11301209
2363.110718.04

Obsah:
1,6 kg

Multifunkční přípravek k pravidelnému komplexnímu ošetření vody

Vzhled a složení: Dvojvrstvé modrobílé tablety s tmaivými částicemi s hmotností 200 g pomalu rozpustné ve vodě. Účinnou látkou je symklossen (kyselina trichlorosikyanurová) 890 g/kg, indexové číslo: 613-031-00-5.

Působení: Dezinfekční přípravek (typu 2) se používá pro komplexní průběžné ošetřování bazénové vody. Spojuje v jedné dávce 5 účinkov potřebných pro správné ošetřování bazénové vody. Přípravek vodu dezinfikuje, likviduje řasy, vločkuje, ziskruje a stabilizuje vápenatou tvrdost. Po ponorení tablety do vody dochází k jejímu postupnému rozpuštění, kdy se uvolňují všechny účinné složky. Pozor! Přípravek nesnížuje vápenatou tvrdost, ale stabilizuje ji, a tak omezuje tvorbu vodního kamene.

Návod k použití a dávkování: Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Pak prověte preventivní ošetření bazénové vody rychlorozprutným chlorovým přípravkem Start a Stabilizátorem Chloru. Podle teploty vody pak přidávejte každých 5–8 dnů 1 až 2 tabletky tohoto přípravku na 30 m³ vody (do teploty 25 °C 1 tabletka a nad 25 °C 2 tabletky). Obecně platí, že po dosažení krátkově čisté a trvalo hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8–7,2 a obsah volného chloru udržován v rozmezí 0,3–0,6 mg/l, při teplotách vody nad 28 °C udržujete koncentraci volného chloru mezi 0,5–0,8 mg/l. Klesne-li obsah volného chloru pod hodnotu 0,3 mg/l, je třeba dodat chlor, pokud je vyšší než 1,0 mg/l, bazén nepoužívejte, omezte dodávku chloru a výčkejte, až tato hodnota klesne do výše uvedeného rozmezí. Hodnotu obsahu chloru průběžně nejméně 2x týdně kontrolejte vhodnými testery.

Způsob aplikace: Plovákem: do dávkovače plováku vložte potřebné množství tablet. Nechte plovák, aby se volně pohyboval po hladině bazénu, kde je větší pohyb vody. Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí: do dávkovače přidejte množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby byla přibližně dodržovaná hodnota obsahu volného chloru. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO BAZÉNU! NIKDY NEDÁVEJTE TABLETY DO SBERÁCE!

NEBEZPEČÍ: Uvolňuje toxicí plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Může způsobit požár; oxidant. Zdraví škodliv při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoké toxicí pro vodní organismy, s dlouhodobým účinkem. Je-li nutná lekářská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chráněte před teplom, horčkou povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. Zamrzly vdechování prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Skládajte uzamčené.

Pokyny pro první pomoc: **Při vděchnutí:** Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Volejte lékaře. **Při styku s kůží:** Neprodleně svlékněte znečištěný oděv a omýte kůžu vodou a mydlem. Pokud podráždění pleti trvá, vyhledejte lékaře. **Při zasazení očí:** Ihned začněte vyláčovat oči s otevřenými víčky a vymutými kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejméně 15 minut. Vyhledejte lekářské ošetření. **Při požití:** Okamžitě vyláčovat ústa a deje vypí 2-5 díl vody (ne více, aby nemohl dojít ke zvracení). NEVYVOLÁVATE ZVRACENÍ! Zajistěte co nejrychlejší lekářské ošetření. Okamžitě volejte lékaře nebo TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402).

Skladování: Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách do 50 °C na dobré vetráném místě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, mimo dosah hořlavých, kyselých a oxidujících látok nebo rozpouštědel. Chraňte před sluncem.

Nepravidelné vedení účinky: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Nedotýkejte se přípravku mokrýma rukama. Výrobce neruší za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Obsah balení: 8 kusů 200 gramových tablet

Doba použitelnosti: Nejméně 3 roky od datu výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidace: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vycistěte několikrát výplachem vody a po vycistění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uveden na obalu.
Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Multifunkčný prípravok k pravidelnému komplexnému ošetrovaniu vody

Vzhled a složenie: Dvojvrstvé modrobiele tablety s tmaivými časticami s hmotnosťou 200 g pomaly rozpustné vo vode. Účinnou látkou je symklossen (kyselina trichlorosikyanurová) 890 g/kg, indexové číslo: 613-031-00-5.

Pôsobenie: Dezinfekčný prípravok (typu 2) sa používa na komplexné priebežné ošetrovanie bazénovej vody. Spája v jednej dávke 5 účinkov potrebných pre správne ošetrovanie bazénovej vody. Prípravok vodu dezinfikuje, likviduje řasy, vločkuje, ziskruje a stabilizuje vápenatú tvrdosť. Po ponorení tablety do vody dochádza k jejmu postupnému rozpuštieniu, kde sa uvoľňujú všetky účinné složky. Pozor! Prípravok neznižuje vápenatú tvrdosť, ale stabilizuje ju, a tak obmedzuje tvorbu vodného kamene.

Návod na použitie a dávkovanie: Pred prvým použitím prípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Potom spravte ošetrovanie bazénovej vody rýchlorozprutným chlorovým prípravkom Start a Stabilizátorom Chloru. Podľa teploty vody potom pridávajte každých 5–8 dní 1 až 2 tabletky tohto prípravku na 30 m³ vody (do teploty 25 °C 1 tabletka a nad 25 °C 2 tabletky). Všeobecne platí, že so dosiahnutím krátkově čistej a trvalo hygienicky nezávadnej vody by malá byt hodnota pH udržiavaná v rozsahu 6,8–7,2 a obsah volného chloru udržiavaný v rozmedzí 0,3–0,6 mg/l, pri teplotach vody nad 28 °C udržujete koncentráciu volného chloru medzi 0,5–0,8 mg/l. Ak klesne obsah volného chloru pod hodnotu 0,3 mg/l, je potreba dať chlor, pokiaľ je vyšší ako 1,0 mg/l, bazén nepoužívať, obmedzete dodávku chloru a výčkejte, až táto hodnota klesne do výšky uvedeného rozmezia. Hodnotu obsahu chloru priebežne najmenej 2x týždenne kontrolujte vhodnými testmi.

Zpôsob aplikácie: Plovákem: do dávkovača plováku vložte potrebné množstvo tablet. Nechte plovák, aby sa volne pohyboval po hladine bazénu, kde je väčší pohyb vody. Dávkovačom vstavaným do cirkulačného potrubia: do dávkovača dajte potrebné množstvo tablet. Regulačné ventily dávkovača nastavte tak, aby bola približne dodržovaná hodnota obsahu volného chloru. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO BAZÉNU! NIKDY NEDÁVEJTE TABLETY DO SBERÁCE!

NEBEZPEČNSTVO: Pri kontakte s kyselinami sa uvoľňuje toxicí plyn (chlor). Pozor! Nepoužívať spolu s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlor). Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže toxický pre vodné organizmy, s dlhoučkým účinkom. Je-li nutná lekárska pomoc, máte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávať mimo dosah detí. Uchovávať mimo dosah tepla, horúčkou povrchov, īskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť. Uchovávať mimo odovz. a iných hořlavých materiálov. Zabráňte vdechovaniu prachu. Zabráňte uvolneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. Uchovávať uzamčené.

NEBEZPEČNSTVO: Pri kontakte s kyselinami sa uvoľňuje toxicí plyn (chlor). Pozor! Nepoužívať spolu s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlor). Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže toxický pre vodné organizmy, s dlouhodobým účinkom. Je-li nutná lekárska pomoc, máte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávať mimo dosah detí. Uchovávať mimo dosah tepla, horúčkou povrchov, īskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť. Uchovávať mimo odovz. a iných hořlavých materiálov. Zabráňte vdechovaniu prachu. Zabráňte uvolneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. Uchovávať uzamčené.

Pokyny pre prvú pomoc: **Po vdechnutí:** Presuňte postiženého na čerstvý vzduch. Volajte lekára. **Po styku s kožou:** Po vdechnutí: Presuňte postiženého na čerstvý vzduch. Volajte lekára. **Po zasazení očí:** Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže toxický pre vodné organizmy, s dlouhodobým účinkom. Je-li nutná lekárska pomoc, máte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávať mimo dosah detí. Uchovávať mimo dosah tepla, horúčkou povrchov, īskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť. Uchovávať mimo odovz. a iných hořlavých materiálov. Zabráňte vdechovaniu prachu. Uchovávať uzamčené.

Pokyny pre prvú pomoc: **Po vdechnutí:** Presuňte postiženého na čerstvý vzduch. Volajte lekára. **Po styku s kožou:** Po vdechnutí: Presuňte postiženého na čerstvý vzduch. Volajte lekára. **Po zasazení očí:** Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže toxický pre vodné organizmy, s dlouhodobým účinkom. Je-li nutná lekárska pomoc, máte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávať mimo dosah detí. Uchovávať mimo dosah tepla, horúčkou povrchov, īskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť. Uchovávať mimo odovz. a iných hořlavých materiálov. Zabráňte vdechovaniu prachu. Uchovávať uzamčené.

Pokyny pre prvú pomoc: **Po vdechnutí:** Presuňte postiženého na čerstvý vzduch. Volajte lekára. **Po styku s kožou:** Po vdechnutí: Presuňte postiženého na čerstvý vzduch. Volajte lekára. **Po zasazení očí:** Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže toxický pre vodné organizmy, s dlouhodobým účinkom. Je-li nutná lekárska pomoc, máte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávať mimo dosah detí. Uchovávať mimo dosah tepla, horúčkou povrchov, īskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť. Uchovávať mimo odovz. a iných hořlavých materiálov. Zabráňte vdechovaniu prachu. Uchovávať uzamčené.

Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodnom uzavretom obale v chalte a suchu pri teplotach do 50 °C na dobré vetránem mieste, oddelenie od potravín, nápojov a krmiv, mimo dosah hořlavých, kyselých a oxidujúcich látok alebo rozpúšťadiel. Chraňte pred sluncem.

Nepravidelné vedľajšie účinky: Pozor! Nepoužívať spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlor). Nedotýkať sa prípravku mokrými rukami. Výrobca neruší za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Obsah balenia: 8 kusov 200 gramových tablet

Doba použitelnosti: Najmenej 3 roky od datu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

Likvidácia: Nepoužitý výrobok alebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vycistěte několikrát výplachem vody a po vycistění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uveden na obale.

Posouzeno: Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA. Registrovné číslo výrobku bio/2366/D/18/CCHLP

Distribútor pre SR: MARIMEX s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 Praha 4 Tel.: +420 261 222 111 • Email: info@marimex.cz Největší internetový obchod s bazény www.marimex.cz

8 590517 009792