DEZINFEKCE

Bazénová chemie

Aquamar®

CHLOR KOMPLEX 5v1

CHLOROVÉ TABLETY VELKÉ

1,6 kg

MARIMEX.cz®

Multifunkční přípravek k pravidelnému komplexnímu ošetření vody

Vzhled a složení: Dvouvrstvé modrobílé tablety s tmavšími částicemi o hmotnosti 200 g pomalu rozpustné ve vodě. Účinnou látkou je symklosen (kyselina trichlorisokyanurová) cca 890 g/kg, indexové číslo: 613-031-00-5.

Působení: Dezinfekční přípravek (typu 2) se používá pro komplexní průběžné ošetřování bazénové vody. Spojuje v jedné dávce 5 účinků potřebných pro správné ošetřování bazénové vody. Přípravek vodu desinfikuje, likviduje řasy, vločkuje, zjiskřuje a stabilizuje vápenatou tvrdost. Po ponoření tablety do vody dochází k jejímu postupnému rozpouštění, kdy se uvolňují všechny účinné složky. Pozor! Přípravek nesnižuje vápenatou tvrdost, ale stabilizuje ji, a tak omezuje tvorbu vodního kamene.

Návod k použití a dávkování: Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,2. Pak proveďte preventivní ošetření bazénové vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem Aquamar Start a stabilizátorem chloru Aquamar Chlor Stabil. Podle teploty vody pak přidávejte každých 5 – 8 dnů 1 až 2 tablety tohoto přípravku na 30 m^3 vody (do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety). Obecně platí, že pro dosažení křišťálově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8 – 7,2 a obsah volného chloru udržován v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l, při teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentraci volného chloru mezi 0,5 – 0,8 mg/l. Klesne-li obsah volného chloru pod hodnotu 0,3 mg/l je třeba dodat chlor, pokud je vyšší než 1,0 mg/l, bazén nepoužívejte, omezte dodávku chloru a vyčkejte, až tato hodnota klesne do výše uvedeného rozmezí. Hodnotu obsahu chloru průběžně nejméně 2x týdně kontrolujte vhodnými testery.

Způsob aplikace: Plovákem: do dávkovacího plováku vložte potřebné množství tablet. Nechte plovák, aby se volně pohyboval po hladině bazénu, kde je větší pohyb vody. Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí: do dávkovače dejte potřebné množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby byla přibližně dodržována hodnota obsahu volného chloru. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO BAZÉNU! NIKDY NEDÁVEJTE TABLETY DO SBĚRAČE!

Nebezpečí. Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Uniklý produkt seberte.

Pokyny pro první pomoc: ***Při vdechnutí:*** Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. V případě nutnosti přivolejte lékařskou pomoc. ***Při styku s kůží:*** Neprodleně svlékněte znečištěný oděv a omyjte kůži vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře. ***Při zasažení očí:*** Ihned začněte vyplachovat tekoucí vodou a pokračujte min. 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. ***Při požití:*** Nevyvolávejte zvracení! Dejte vypít 1 – 2 sklenice vody. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře nebo TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402).

Skladování: Uchovávejte / skladujte odděleně od oděvů / potravin, nápojů a krmiv / kyselých a oxidujích látek / rozpouštědel / hořlavých materiálů. Skladujte v původních těsně uzavřených obalech na chladném dobře větraném místě. Nevystavujte teplotě nad 50°C.

Nepříznivé vedlejší účinky: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Nedotýkejte se přípravku mokrýma rukama. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Obsah balení: 8 kusů 200 gramových tablet

Doba použitelnosti: Nejméně 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidace: Přípravek nevypouštějte do kanalizace. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu! Zákaz opětovného použití obalu.

Datum výroby: Uveden na obalu.

Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

www.**aquamar**.cz

Obsah: 1,6 kg

2363.150413.01

Distributor:
Marimex CZ, spol. s r.o.
Libušská 264
142 00 Praha 4
Tel: 00420 241 727 740
www.marimex.cz
e-mail: info@marimex.cz
Největší internetový obchod s bazény www.marimex.cz

11301209

8 590517 009792

Multifunkčný prípravok k pravidelnému komplexnému ošetrovaniu vody

Vzhľad a zloženie: Dvojvrstvové modrobiele tabletky s tmavšími časticami s hmotnosťou 200 g pomaly rozpustné vo vode. Účinnou látkou je symklozén (kyselina trichlorisokyanurová) cca 890 g/kg, indexové číslo: 613-031-00-5.

Pôsobenie: Dezinfekčný prípravok (typu 2) sa používa na komplexné priebežné ošetrovanie bazénovej vody. Spája v jednej dávke 5 účinkov potrebných na správne ošetrovanie bazénovej vody. Prípravok vodu dezinfikuje, likviduje riasy, vločkuje, ziskruje a stabilizuje vápenatú tvrdosť. Po ponorení tabletky do vody dochádza k jej postupnému rozpusteniu, kedy sa uvoľňujú všetky účinné zložky. Pozor! Prípravok neznižuje vápenatú tvrdosť, ale stabilizuje ju, a tak obmedzuje tvorbu vodného kameňa.

Návod na použitie a dávkovanie: Pred prvým použitím prípravku upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,2. Potom spravte ošetrenie bazénovej vody rýchlorozpustným chlórovým prípravkom Aquamar Start a stabilizátorom chlóru Aquamar Chlor Stabil. Podľa teploty vody potom pridávajte každých 5 – 8 dní 1 až 2 tabletky tohto prípravku na 30 m^3 vody (do teploty 25 °C 1 tabletku a nad 25 °C 2 tabletky). Všeobecne platí, že na dosiahnutie kríštálovo čistej a trvalo hygienicky nezávadnej vody by mala byť hodnota pH udržiavaná v rozsahu 6,8 – 7,2 a obsah voľného chlóru udržovaný v rozmedzí 0,3 – 0,6 mg/l, pri teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentráciu voľného chlóru medzi 0,5 – 0,8 mg/l . Ak klesne obsah voľného chlóru pod hodnotu 0,3 mg/l je potreba dodať chlór, pokiaľ je vyšší ako 1,0 mg/l, bazén nepoužívajte, obmedzte dodávku chlóru a vyčkajte, až táto hodnota klesne do výšky uvedeného rozmedzia. Hodnotu obsahu chlóru priebežne najmenej 2x týždenne kontrolujte vhodnými testermi.

Spôsob aplikácie: Plavákom: do dávkovacieho plaváku vložte potrebné množstvo tabliet. Nechajte plavák, aby sa voľne pohyboval po hladine bazéna, kde je väčší pohyb vody. Dávkovačom vstavaným do cirkulačného potrubia: do dávkovača dajte potrebné množstvo tabliet. Regulačné ventily dávkovača nastavte tak, aby bola približne dodržiavaná hodnota obsahu voľného chlóru. NIKDY NEHÁDŽTE TABLETY DO BAZÉNA! NIKDY NEDÁVAJTE TABLETY DO ZBERAČA!

Nebezpečenstvo. Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Zozbierajte uniknutý produkt.

Pokyny pre prvú pomoc: ***Po vdýchnutí:*** Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. V prípade nutnosti vyhľadajte lekársku pomoc. ***Po styku s kožou:*** Neodkladne si vyzlečte znečistený odev a umyte si kožu vodou a mydlom. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekára. ***Po zaslahnutí očí:*** Ihneď začnite vyplachovať tečúcou vodou a pokračujte min. 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. ***PO požití:*** Nevyvolávajte zvracanie! Dajte vypiť 1 – 2 poháre vody. Ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte lekára alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. (tel. NTIC 02 5477 4166).

Skladovanie: Uchovávajte / skladujte mimo odevov / potravín, nápojov a krmív / kyslých a oxidujúcich látok / rozpúšťadiel / horľavých materiálov. Skladujte v pôvodných tesne uzatvorených obaloch na chladnom dobre vetranom mieste. Nevystavujte teplote nad 50 °C.

Nepriaznivé vedľajšie účinky: Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Nedotýkajte sa prípravku mokrými rukami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Obsah balenia: 8 kusov 200 gramových tabliet

Doba použiteľnosti: Najmenej 3 roky od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

Likvidácia: Prípravok nevypúšťajte do kanalizácie. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečného odpadu. Zákaz opätovného použitia obalu.

Dátum výroby: Uvedený na obale.

Posúdené VUOS a.s., certifikačný orgán CETA. Registračné číslo výrobku bio/658/D/13/CCHLP

aquamar.marimex.sk

MARIMEX.sk®

Distribútor pre SR:
MARIMEX SK, spol. s r.o.
Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
Tel.: 00421 244 453 001
www.marimex.sk
e-mail: info@marimex.sk
Najväčší internetový obchod s bazénmi
www.marimex.sk