

# MARIMEX

bazénová chemie

5v1

## CHLOR KOMPLEX

CHLOROVÉ TABLETY VELKÉ

10 kg

1

REGULACE pH

2

DEZINFEKCE

3

ŘASY

4

VLOČKOVÁNÍ

### Multifunkční přípravek k pravidelnému komplexnímu ošetření vody

**Vzhled a složení:** Dvourvrstvé modrobílé tablety s tmavšími částicemi o hmotnosti 200 g pomalu rozpustné ve vodě. Obsahuje symklosen (890 g/kg), síran hlinitý a síran měďnatý, pentahydrát.

**Působení:** Dezinfekční přípravek (typu 2) se používá pro komplexní průběžné ošetřování bazénové vody. Spojuje v jedné dávce 5 účinných potřebných pro správné ošetřování bazénové vody. Přípravek vody dezinfikuje, likviduje řasy, vločky, zjišťuje a stabilizuje vápenatou tvrdost. Po ponoření tablety do vody dochází k jejímu postupnému rozpouštění, kdy se uvolňují všechny účinné složky. Pozor! Přípravek neznížíje vápenatou tvrdost, ale stabilizuje ji, a tak omezuje tvorbu vodního kamene.

**Návod k použití a dávkování:** Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Pak proveďte preventivní ošetření bazénové vody rychlorozpuštěným chlorovým přípravkem Start a Stabilizátorem Chloru. Podle teploty vody pak přidávejte každých 5–8 dnů 1 až 2 tablety tohoto přípravku na 30 m<sup>3</sup> vody (do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety). Obecně platí, že pro dosažení krystalově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8–7,2 a obsah volného chloru udržován v rozmezí 0,3–0,6 mg/l, při teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentraci volného chloru mezi 0,5–0,8 mg/l. Klesne-li obsah volného chloru pod hodnotu 0,3 mg/l, je třeba dodat chlor, pokud je vyšší než 1,0 mg/l, bazén nepoužívejte, omezte dodávku chloru a vyčkejte, až tato hodnota klesne do výše uvedeného rozmezí. Hodnotu obsahu chloru průběžně nejméně 2x týdně kontrolujte vhodnými testery.

**Způsob aplikace:** Plovákem: do dávkovacího plováku vložte potřebné množství tablet. Nechte plovák, aby se volně pohyboval po hladině bazénu, kde je větší pohyb vody. Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí: do dávkovače dejte potřebné množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby byla přibližně dodržována hodnota obsahu volného chloru. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO BAZÉNU! NIKDY NEDÁVÁJTE TABLETY DO SBĚRAČE!

**NEBEZPEČÍ. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Spůsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo šítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chráněte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. Zamezte vdechování prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Skladujte uzamčené.**

**Polkny pro první pomoc: Při vdechnutí:** Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Volejte lékaře. **Při styku s kůží:** Neprodleně svlékněte znečištěný oděv a omyjte kůži vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře. **Při zasažení očí:** Ihned začněte vyplachovat oči s otevřenými víčky a vyjmutými kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. **Při požití:** Okamžitě vypláchněte ústa a dejte vypít 2–5 dl vody (ne více, aby nemohlo dojít ke zvracení). NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Zajistěte co nejrychlejší lékařské ošetření. Okamžitě volejte lékaře nebo TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDIŠKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402).

**Skladování:** Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách do 50 °C na dobře větraném místě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, mimo dosah hořlavých, kyselých a oxidujících látek nebo rozpouštědel. Chráněte před sluncem.

**Nepříznivé vedlejší účinky:** Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Nedotýkejte se přípravku mokřými rukama. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

**Obsah balení:** 50 kusů 200 gramových tablet

**Doba použitelnosti:** Nejméně 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

**Likvidace:** Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrné nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádoby pro sběr komunálního odpadu.

**Datum výroby:** Uveden na obalu.  
Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.  
UIF: 2SHS-UK8Y-7P2Y-H2Q5

Obsah: 10 kg



11313115

2533.011024.01

Distributor:

MARIMEX CZ s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 Praha 4  
Tel.: +420 261 222 111 • Email: info@marimex.cz  
Největší internetový obchod s bazény www.marimex.cz



MARIMEX

www.marimex.cz  
www.marimex.sk

Distribútor pre SR:

MARIMEX SK spol. s r.o., Rožňavská 3029/17, 831 04 Bratislava  
Tel.: 02/330 04 194 • Email: info@marimex.sk  
Najväčší internetový obchod s bazénmi www.marimex.sk

### Multifunkčný prípravek k pravidelnému komplexnému ošetrovaniu vody

**Vzhľad a zloženie:** Dvojvrstvé modrobíle tablety s tmavšími časťami s hmotnosťou 200 g pomaly rozpustné vo vode. Obsahuje symklosen (890 g/kg), síran hlinitý a pentahydrát síranu meďnatého.

**Pôsobenie:** Dezinfekčný prípravok (typu 2) sa používa na komplexné priebežné ošetrovanie bazénovej vody. Spája v jednej dávke 5 účinkov potrebných na správne ošetrovanie bazénovej vody. Prípravok vody dezinfikuje, likviduje riasy, vločky, zisťuje a stabilizuje vápenatú tvrdosť. Po ponorení tablety do vody dochádza k jej postupnému rozpusteniu, kedy sa uvoľňujú všetky účinné zložky. Pozor! Prípravok neznížuje vápenatú tvrdosť, ale stabilizuje ju, a tak obmedzuje tvorbu vodného kamňa.

**Návod na použitie a dávkovanie:** Pred prvým použitím prípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Potom spravte ošetrovanie bazénovej vody rychlorozpuštěným chlorovým prípravkom Start a Stabilizátorom Chloru. Podľa teploty vody potom pridávejte každých 5–8 dní 1 až 2 tablety tohto prípravku na 30 m<sup>3</sup> vody (do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety). Všeobecne platí, že na dosiahnutie krystalovo čistej a trvalo hygienicky nezávadnej vody by mala byť hodnota pH udržovaná v rozsahu 6,8–7,2 a obsah volného chloru udržovaný v rozmedzí 0,3–0,6 mg/l, pri teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentráciu volného chloru medzi 0,5–0,8 mg/l. Ak klesne obsah volného chloru pod hodnotu 0,3 mg/l, je potreba dodať chlor, pokiaľ je vyšší ako 1,0 mg/l, bazén nepoužívať, obmedzte dodávku chloru a vyčkejte, až táto hodnota klesne do výšky uvedeného rozmedzia. Hodnotu obsahu chloru priebežne nejméně 2x týdně kontrolujte vhodnými testery.

**Spôsob aplikácie:** Plovákem: do dávkovacieho plováku vložte potrebné množstvo tablet. Nechajte plovák, aby sa volne pohyboval po hladine bazéna, kde je väčší pohyb vody. Dávkovačom vestavěným do cirkulačného potrubia: do dávkovače dajte potrebné množstvo tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby bola přibližně dodržována hodnota obsahu volného chloru. NIKDY NEHÁDŽTE TABLETY DO BAZÉNA! NIKDY NEDÁVÁJTE TABLETY DO ZBERAČA!

**NEBEZPEČENSTVO. Pri kontakte s kyselinami sa uvoľňuje toxický plyn. Pozor! Nepoužívať spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlor). Může prispieť k rozvoju požiaru; oxidáčné činidlo. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Může spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskiev, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Neľafajte. Uchovávať mimo oděvov a iných hořlavých materiálů. Zabráňte vdechovaniu prachu. Zabráňte uvolneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. Uchovávať uzamknuté.**

**Polkny pre prvú pomoc: Po vdechnutí:** Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Volejte lékaře. **Po styku s kůží:** Neodkladne vyzlečte znečištěný oděv a umyte kůži vodou a mýdlem. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekára. **Po zasažení očí:** Ihned začnite vyplachovať oči s otvorenými viečkami a vybranými kontaktnými šošovkami pod tekúcou vodou najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku starostlivosť. **Po požití:** Okamžite vypláchnite ústa a dajte vypít 2–5 dl vody (nie viac, aby nemohlo dôjsť k zvracaniu). NEVYVOLÁVATE ZVRACANIE! Zaisite čo najrychlejšie lekárske ošetrovanie. Okamžite volejte lekára alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (tel. NTIC 02 5477 4166).

**Skladovanie:** Prípravok skladujte v pôvodnom uzatvorenom obale v chladu a suchu při teplotách do 50 °C na dobre vetranom mieste, oddelene od potravin, nápojov a krmiv, mimo dosah hořlavých, kyselých a oxidujúcich látok alebo rozpúšťadiel. Chráněte pred slnkom.

**Nepříznivé vedlejší účinky:** Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Nedotýkejte sa přípravku mokřými rukami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávným použitím prípravku.

**Obsah balenia:** 50 kusov 200 gramových tablet

**Doba použitelnosti:** Najmenej 3 roky od dátumu výroby při dodržení skladovacích podmienok.

**Likvidácia:** Nepoužitý výrobok alebo prázdný obal so zbytkami odevzdejte v zberní nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladnom vyprázdnění vyčistěte niekoľkokrát výplachom vody a po vyčistení je možné ho odložiť do nádoby na zber komunálneho odpadu.

**Datum výroby:** Uvedený na obale.  
Posúdené VUOS a.s., certifikačný orgán CETA.  
Registračné číslo výrobku bu/2366/D/18/CCHLP

