

MARIMEX



bazénová chemie

5v1

CHLOR KOMPLEX

CHLOROVÉ TABLETY VELKÉ

1
REGULACE pH

2

DEZINFEKCE

3
ŘASY

4
VLOČKOVÁNÍ
1 kg



Obsah: 1 kg
11301208
2355.110718.05

Multifunkční přípravek k pravidelnému komplexnímu ošetření vody

Vzhled a složení: Dvojvrstvé modrobílé tablety s tmaivými částicemi o hmotnosti 200 g pomalu rozpustné ve vodě. Účinnou látkou je smykolos (kyselina trichloroisokyanurová) 890 g/kg, indexové číslo: 613-031-00-5.

Působení: Dezinfekční přípravek (typu 2) se používá pro komplexní průběžné ošetřování bazénové vody. Spojuje v jedné dávce 5 účinků potřebných pro správné ošetřování bazénové vody. Připravek vodu dezinfikuje, likviduje řasy, vločkové, ziskruje a stabilizuje vápenatou tvrdost. Po ponovení tablety do vody dochází k jejemu postupnému rozpouštění, kdy se uvolňují všechny účinné složky. Pozor! Přípravek nesníží vápenatou tvrdost, ale stabilizuje ji, a tak obmedzuje tvorbu vodního kamene.

Návod k použití a dávkování: Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Pak provedte preventivní ošetření bazénové vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem Start a Stabilizátorem Chloru. Podle teploty vody pak přidávejte každých 5–8 dnů 1 až 2 tablety tohoto přípravku na 30 m³ vody (do teploty 25 °C 1 tabletka a nad 25 °C 2 tablety). Obecně platí, že pro dosažení krátkofázové čistoty a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8–7,2 a obsah volného chlorku udržován v rozmezí 0,3–0,6 mg/l, pri teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentraci volného chlorku mezi 0,5–0,8 mg/l. Klesne-li obsah volného chlorku pod hodnotu 0,3 mg/l, je třeba dodat chlór, pokud je vyšší než 1,0 mg/l, bazén nepoužívajte, omezte dodávku chlorku a vyčkejte, až tač hodnota klesne do výše uvedeného rozmezí. Hodnotu obsahu chlorku průběžně nejméně 2x týdně kontrolujte vhodnými testery.

Způsob aplikace: Plovákem: do dávkovačového plaváku vložte požádavnu množství tablet. Nechte plovák, aby se volně pohyboval po hladině bazénu, kde je větší pohyb vody. Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí: do dávkovače dejte požádavnu množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby byla přibližně dodržována hodnota obsahu volného chlorku. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO BAZÉNU! NIKDY NEDÁVÁJTE TABLETY DO SBERÁČU!

NEBEZPEČÍ: Uvolňuje toxický plyn s kyselinami. **Pozor!** Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Může zezlit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal s žádatelstvím o vločkového uchovávání mimo dosah dětí. Chráněte před tepleny, horlkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohnem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávajte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. Zamezte vdechování prachu. Zahraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Skladujte uzamčeně.

Pokyny pro první pomoc: **Při vdechnutí:** Přenechte postiženému na čerstvý vzduch. Volejte lékaře. **Při styku s kůží:** Neprolidněte znečištěný oděv a myjte kůži vodou a mydlem. Pokud podráždění přetrvalo, vyhledejte lékaře. **Při zasazení očí:** Ihned začnite vylapovat oči s otevřenými víčky a výjmutými kontaktními čočkami pod teckou vodou nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. **Při požití:** Okamžitě vylapňte ústa a dejte vypít 2-5 l vody (ne vše, aby nemohlo dojít ke zvarení). NEVYVOLÁVÁTE ZVRACANÍ! Zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření. Okamžitě volajte lékaře nebo TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STREDISKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402).

Skladování: Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách do 50 °C na dobré větraném místě, oddělené od potravin, napojů a krmiv, mimo dosah hořlavých, kyselých a oxidujících látok nebo rozpouštěadel. Chráněte před sluncem.

Nepříznivě vedení účinky: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Nedotýkejte se přípravku mokrýma rukama. Výrobce neruší za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Doba použitelnosti: Nejméně 3 roky od datu výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidace: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytek odvezďte do světelně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vycistěte několikrát výplachem vody a po vycistění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uveden na obalu.
Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Distributor:
Marimex CZ s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 Praha 4
Tel.: +420 261 222 111 • Email: info@marimex.cz
Největší internetový obchod s bazény www.marimex.cz

Multifunkčný prípravok k pravidelnému komplexnému ošetrovaniu vody

Vzhled a složenie: Dvojvrstvové modrobiele tablety s tmaivými časticami s hmotnosťou 200 g pomaly rozpustné vo vode. Účinnú látku je smykolos (kyselina trichloroisokyanurová) 890 g/kg, indexové číslo: 613-031-00-5.

Pôsobenie: Dezinfekčný prípravok (typu 2) sa používa na komplexné pravidelné ošetrovanie bazénovej vody. Spája v jednej dávke 5 účinkov potrebných pre správne ošetrovanie bazénovej vody. Prípravok vodu dezinfikuje, likviduje řasy, vločkuje, ziskruje a stabilizuje vápenatú tvrdosť. Po ponovení tablety do vody dochádza k jejmu postupnému rozpusteniu, kde sa uvoľňujú všetky účinné zložky. Pozor! Prípravok neznižuje vápenatú tvrdosť, ale stabilizuje ju, a tak obmedzuje tvorbu vodného kamene.

Návod na použitie a dávkovanie: Pred prvým použitím prípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Potom správne ošetrovanie bazénovej vody rychlorozpustným chlorovým prípravkom Start a Stabilizátorom Chloru. Podľa teploty vody potom pridávajte každých 5–8 dní 1 až 2 tabletky tohto prípravku na 30 m³ vody (do teploty 25 °C 1 tabletka a nad 25 °C 2 tabletky). Všeobecne platí, že na dosiahnutie krátkofázové čistoty a trvale hygienicky nezávadnej vody by mala byť hodnota pH udržiavaná v rozsahu 6,8–7,2 a obsah volného chlorku udržiavaný v rozmedzí 0,3–0,6 mg/l, pri teplotach vody nad 28 °C udržiavať koncentráciu volného chlorku medzi 0,5–0,8 mg/l. Ak klems obsah volného chlorku pod hodnotu 0,3 mg/l, je potrebné dodat chlór, pokial je vyšší ako 1,0 mg/l, bazén nepoužívajte, obmedzte dodávku chlorku a vyčkejte, až tato hodnota klems do výšky uvedeného rozmeria. Hodnotu obsahu chlorku priebežne najmenej 2x týždenne kontroly vhodnými testermi.

Spôsob aplikácie: Plavákom: do dávkovačového plaváku vložte potrebné množstvo tablet. Nechajte plavák, aby sa volne pohyboval po hladine bazénu, kde je väčší pohyb vody. Dávkovačom vestavenným do cirkulačného potrubia: do dávkovače dejte potrebné množstvo tablet. Regulačné ventily dávkovača nastavte tak, aby bola približne dodržovaná hodnota obsahu volného chlorku. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO BAZÉNU! NIKDY NEDÁVÁJTE TABLETY DO SBERÁČU!

NEBEZPEČENSTVO. Pri kontakte s kyselinami sa uvoľňuje toxický plyn. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlor). Môže spôsobiť požiar; oxidant. Skodlivý po požití. Spôsobuje väčšie podráždzenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích cest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosah detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horľavých povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov prachu. Zahraňte uvoľnenie do životného prostredia. Nosť ochranné rukavice/ochranné okuliare. Uchovávajte uzamknuté.

Pokyny pre prvu pomoc: **Pri vdechnutí:** Presuňte postiženého na čerstvý vzduch. Volajte lekára. **Pri styku s kôžou:** Neodkladne vylezieť znečistený oděv a umyte kôžu vodou a mydlem. Pokial podráždenie pretrivalo, vyhledejte lekára. **Pri zasazení očí:** Ihned začnite vylapovať oči s otevrenými víčkami a výjmutými kontaktnými čočkami pod teckou vodou nejmenej 15 minút. Vyhledejte lekárske ošetrenie. **Pri požití:** Okamžitě vylapňte ústa a dejte vypít 2-5 l vody (nie vše, aby nemohlo dojti ke zvareniu). NEVYVOLÁVATE ZVRACANIE! Zajistite co najrychlejšie lekárske ošetrenie. Okamžitě volajte lekára alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Presuňte postiženého na čerstvý vzduch. Volajte lekára.

Skladovanie: Přípravok skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách do 50 °C na dobré větraném místě, oddělené od potravin, napojů a krmiv, mimo dosah hořlavých, kyselých a oxidujících látok nebo rozpouštěadel. Chráněte před sluncem.

Nepříznivě vedení účinky: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Nedotýkejte se přípravku mokrýma rukama. Výrobce neruší za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Doba použitelnosti: Nejméně 3 roky od datu výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidace: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytek odvezďte do světelně nebezpečného odpadu!

Datum výroby: Uveden na obale.
Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.
Registracné číslo výrobku bio/2366/D/18/CCHLP

Distribútor pre SR:
MARIMEX s.r.o., Rožňavská 3029/17, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/330 04 194 • Email: info@marimex.sk
Najväčší internetový obchod s bazénmi www.marimex.sk



8 590517 007415