

MARIMEX



bazénová chemie

2.
KROK

AKTIVÁTOR

AKTIVACE KYSLÍKOVÝCH TABLET

BEZCHLOROVÁ
ŘADA

1l

Přípravek aktivující funkci kyslíkových tablet

Vzhled a složení: Mírně viskózní kapalina. Obsahuje jako účinnou látku poly[(chloromethyl)oxiran-co-dimethylamin] (cca 250 g/litr), CAS 25988-97-0.

Působení: Přípravek se používá vždy v kombinaci s přípravkem na oxidaci nečistot Kyslíkové tablety!

Návod k použití: Před použitím přípravku upravte hodnotu pH na rozmezí 6,8–7,2. Aby byl účinek přípravku správný, je třeba nejprve použít přípravek Kyslíkové tablety, který vodu zbaví zbytkového chlóru. Jinak by mohlo dojít k nežádoucím zabarvení vody způsobené reakcí přípravku se zbytkovým chlórem. Přípravek se dává pravidelně minimálně jednou týdně vždy cca 12–24 hodin po pravidelné aplikaci přípravku Kyslíkové tablety.

Dávkování: 1) Počáteční dávka: 100 ml/m³ vody v bazénu, 2) Udržovací dávka: 65 ml/m³ vody v bazénu minimálně 1x týdně. Příslušnou dávku přípravku rozmíchejte ve vodě v čistém umělohmotném vědru a za provozu filtračního zařízení vše pomalu vylijte do skimmeru.

Poznámka: 1 polévková lžice je asi 15 ml přípravku.

Varování: Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch. **Při styku s kůží:** Začněte ihned oplachovat vodou a pokračujte po dobu 15 minut. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyčistěte. Pokud dojde k podráždění, přivolejte lékařskou pomoc. **Při zasažení očí:** Okamžitě vymývejte proudem tekoucí vody po dobu 15 minut. Ihned přivolejte lékařskou pomoc. **Při požití:** NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! Dejte vypít 1–2 sklenice vody. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. V případě problémů okamžitě volejte lékaře nebo TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293 nebo 224 915 402).

Skladování: Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu, v suchu a temnu při teplotách 0 - 30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Neskladujte spolu se zásadami a kyselinami. Chraňte před sluncem a mrazem.

Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. **Doba použitelnosti:** 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidace: Přípravek nevypouštějte do kanalizace. Nepoužitý přípravek a obal odevzdejte ve sběrné nebezpečného odpadu! Prázdný obal po důkladném vypláchnutí vodou je možné odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: uveden na obalu.

Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Obsah: 1l



11313107

2367.011217.03

Distributor:

Marimex CZ s.r.o.
Libušská 221/264
142 00 Praha 4
Tel: +420 261 222 111
Email: info@marimex.cz
Největší internetový
obchod s bazénny
www.marimex.cz



MARIMEX

www.marimex.cz

www.marimex.sk

Aktivátor - bazény

Přípravek aktivující funkci kyslíkových tablet

Vzhled a složení: Mírně viskózní kvapalina. Obsahuje ako účinnú látku polymérny kvartérny chlorid amónny (cca 250 g/liter), CAS 25988-97-0.

Působení: Přípravek sa používa vždy v kombinácii s prípravkom na oxidáciu nečistôt Kyslíkové tablety!

Návod na použitie: Pred použitím prípravku upravte hodnotu pH na rozmedzí 6,8–7,2. Aby bol účinok prípravku správny, je potrebné najprv použiť prípravek Kyslíkové tablety, ktorý vodu zbaví zvyškového chlóru. Inak by mohlo dôjsť k nežiaducemu zabarbeniu vody spôsobené reakciou prípravku so zvyškovým chlórom.

Přípravek sa dává pravidelně minimálně raz týždenne vždy cca 12–24 hodin po pravidelnej aplikácii prípravku Kyslíkové tablety .

Dávkovanie: 1) Počiatočná dávka: 100 ml/m³ vody v bazéne, 2) Udržiavacia dávka: 65 ml/m³ vody v bazéne minimálne 1x týždenne. Príslušnú dávku prípravku rozmiešajte vo vode v čistej umelohmotnej nádobe a za prevádzky filtračného zariadenia všetko pomaly vylite do skimmeru.

Poznámka: 1 polievková lyžica je asi 15ml prípravku.

Pozor: Škodlivý po požití. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávejte mimo dosahu detí. Po manipulácii si starostlivo umyte ruky. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

Pokyny pre prvú pomoc: Pri nadýchání: Postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch. **Pri styku s pokožkou:** Začnite ihneď oplachovať vodou a pokračujte po dobu 15 minút. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyčistíte. Pokiaľ dôjde k podráždeniu, privolajte lekársku pomoc. **Pri zasiahnutí očí:** Okamžite vymývajte prúdom tečúcej vody po dobu 15 minút. Ihneď privolajte lekársku pomoc. **Pri požití:** NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE! Dajte vypít 1–2 poháre vody. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade problémov okamžite volajte lekára alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (2 5477 4166).

Skladovanie: Prípravek skladujte v pôvodnom uzatvorenom obale, na suchom a tmavom mieste pri teplotách 0 - 30 °C, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Neskladujte spolu so zásadami a kyselinami. Chraňte pred slnkom a mrazom.

Upozornenie: Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

Likvidácia: Prípravek nevypúšťajte do kanalizácie. Nepoužitý prípravek a obal odovzdajte v zberní nebezpečného odpadu! Prázdny obal po dôkladnom vypláchnutí vodou je možné odložiť do nádob na zber komunálneho odpadu.

Dátum výroby: uvedený na obale.

Posúdené VUOS a.s., certifikačný orgán CETA.

Distribútor pre SR:

MARIMEX SK s.r.o.
Rožňavská 3029/17
831 04 Bratislava
Tel: 02/330 04 194
Email: info@marimex.sk
Najväčší internetový
obchod s bazénmi
www.marimex.sk

