

# MARIMEX

wellness & spa

1.  
KROK

## KYSLÍKOVÉ TABLETY

BEZCHLOROVÁ DEZINFEKCE VODY

PRO  
VÍRIVÉ BAZÉNY

0,5 kg



Obsah:  
0,5 kg

11313104  
2364.110718.05

Distributor:  
Marimex CZ s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 Praha 4  
Tel.: +420 261 222 111 • Email: info@marimex.cz  
Největší internetový obchod s bazény [www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

MARIMEX  
[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)  
[www.marimex.sk](http://www.marimex.sk)

Distribútor pre SR:  
MARIMEX SK spol. s r.o., Rožňavská 3029/17, 831 04 Bratislava  
Tel.: 02/330 04 194 • Email: info@marimex.sk  
Najväčší internetový obchod s bazénmi [www.marimex.sk](http://www.marimex.sk)

### Přípravek určený k pravidelnému oxidačnímu ošetření vody

**Vzhled a složení:** Bílé tablety (20g) s alginicním účinkem. Účinnou látkou je bis(peroxosiran)-bis(siran) pentadraselný (960 g/kg), CAS: 70693-62-8.

**Působení:** Prostředek se používá pro komplexní pravidelné ošetřování vody v kombinaci s přípravkem Spa Aktivátor. Po ponorení tablety do vody dochází k jejímu rozpouštění, kdy se uvolňuje účinná složka, která oxiduje nečistoty přítomné ve vodě. Pro správnou funkci používejte pravidelně dle návodu spolu s pravidelným ošetřením vody pomocí přípravku Spa Aktivátor.

**Návod k použití a dávkování:** Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Při prvním ošetření vody a jako šokové opatření cca každé 2 týdny dávkujte 10–15 tablet / 10 m<sup>3</sup> vody. Během provozu vířivé vany přidávejte další tablety podle potřeby.

Obecně platí, že pro dosažení krátkově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8–7,2 a obsah aktivního kyslíku udržován v rozmezí 8–10 mg/l. Při teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentraci aktivního kyslíku na hodnotě minimálně 10 mg/l a provádějte šokové ošetření 1x týdně. Klesne-li obsah aktivního kyslíku pod hodnotu 8 mg/l, je třeba přidat další tablety, pokud je vyšší než 10 mg/l, omezte dávkování tablet a vyčkejte, až tato hodnota klesne do výše uvedeného rozmezí. Hodnotu obsahu aktivního kyslíku **pravidelně** nejméně 2x týdně kontrolujte vhodnými testery u výstupu vody z vířivé vany do filtračního okruhu.

**Způsob aplikace: Plovákem:** do dávkovačho plováku vložte potřebné množství tablet. Nechte plovák, aby se volně pohyboval po hladině, kde je větší pohyb vody. **Dávkovačem** vestavěným do cirkulačního potrubí: do dávkovače dejte potřebné množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby byla přibližně dodržována hodnota koncentrace aktivního kyslíku. NIKDY NEHADĚTE TABLETY DO VÍRIVÉ VAN!

**NEBEZPEČÍ: Zdraví škodlivý při požití.** Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobcu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

**Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejovery štítky. Skládajte uzamčeně.**

**Pokyny pro první pomoc: Při nadýchnání:** Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch až do doby odzenného příznaku. **Při styku s kůží:** Začněte ihned oplachovat vodou a pokračujte po dobu 15 minut. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vycistěte. Pokud podraždění přetrvává, přivolejte lékařskou pomoc. **Při zasažení očí:** Okamžitě vymývejte proudem tekoucí vody po dobu 15 minut. Ihned přivolejte lékařskou pomoc. **Při požití:** NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! Dejte vypít 1–2 sklenice vody. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402) nebo lékaře.

**Skladování:** Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, v suchu a chladnu, v době větraných prostorách mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně.

**Upozornění:** Pozor! V koncentrovaném stavu nepoužívejte společně s jinými výrobky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

**Doba použitelnosti:** Nejméně 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

**Likvidace:** Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odvezdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vycistěte několikrát výplachem vody a po vycistění je možné ho odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

**Datum výroby:** Uveden na obalu.

### Pripravok určený k pravidelnému oxidačnému ošetrovaniu vody

**Vzhľad a zloženie:** Biele tablety (20g) s alginicným účinkom. Účinnou látkou je hydrogenperoxosiran-bissiran pentadraselný (960 g/kg), CAS: 70693-62-8.

**Pôsobenie:** Prostriedok sa používa pre komplexné priebežné ošetrovanie vody v kombinácii s prípravkom Spa Aktivátor. Po ponorení tablety do vody dochádza k jej rozpušťaniu, kedy sa uvolňuje účinná látka, ktorá oxiduje nečistoty prítomné vo vode. Pre správnu funkciu používajte pravidelne podľa návodu spolu s pravidelným ošetrovaniem vody pomocou prípravku Spa Aktivátor.

**Návod na použitie a dávkovanie:** Pred prvým použitím prípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Pri prvom ošetroení vody a ako šokové opatrenie cca každé 2 týždne dávkujte 10–15 tablet / 10 m<sup>3</sup> vody. Počas prevádzky vírivé vane pridávajte ďalšie tablety podľa potreby.

Všeobecne platí, že pre dosiahnutie krátkově čistej a trvale hygienicky nezávadnej vody by mala byť hodnota pH udržovaná v rozsahu 6,8–7,2 a obsah aktívneho kyslíku udržovaný v rozmezí 8–10 mg/l. Pri teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentráciu aktívneho kyslíku na hodnote minimálne 10mg/l a vykonávajte šokové ošetroenie 1x týždenne. Ak klesne obsah aktívneho kyslíku pod hodnotu 8 mg/l, musíte pridať ďalšie tablety, ak je vyšší ako 10mg/l, obmedzte dávkovanie tablet a počkajte až tato hodnota klesne do výšky uvedeného rozmeria. Hodnotu obsahu aktívneho kyslíku priebežne najmenej 2x týždenne kontrolujte vhodnými testery na výstupu vody z vírivé vane do filtračného okruhu.

**Spôsob aplikácie: Plavákom:** do dávkovačho plaváku vložte potrebné množstvo tablet. Nechajte plavák, aby sa volne pohyboval po hladine, kde je väčší pohyb vody. **Dávkovačom** vstavaným do cirkulačného potrubia: do dávkovača dajte potrebné množstvo tablet. Regulační ventily dávkovača nastavte tak, aby bola približne dodržiavaná hodnota koncentrácie aktívneho kyslíku. NIKDY NEHADĚTE TABLETY DO VÍRIVÉ VAN!

**NEBEZPEČENSTVO: Škodlivý po požití.** Spôsobuje väčšie poleptanie koži a poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárská pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobcu. Uchovávajte mimo dosah detí. Pri používaní výrobku nejedzte, nepijte ani nefajcťte. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné okuliare/ochranu tváre. Uchovávajte uzamknuté.

**Pokyny pre prvú pomoc: Pri nadýchaní:** Postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch až do doby odznenia príznakov. **Pri styku s pokožkou:** Začnite ihned oplachovať vodou a pokračujte po dobu 15 minút. Kontaminovaný oděv pred ďalším použitím vycistite. Ak podráždenie pretrváva, privolajte lekársku pomoc. **Pri zasažení očí:** Okamžitě vymývejte proudem tekoucí vody po dobu 15 minút. Ihned privolajte lekársku pomoc. **Pri požití:** NEVYVOLÁVATE ZVRACANIE! Dajte vypít 1–2 sklenice vody. Ihned vyhľadajte lekársku pomoc. Okamžitě volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (tel. NTIC 2 547 4166) alebo lekára. **Skladovanie:** Prípravok skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, oddelené od potravín, nápojov a krmív, v suchu a chladu, v dobre vetraných priestoroch mimo dosah zdrojov tepla a otvoreného ohňa.

**Upozornenie:** Pozor! V koncentrovanom stave nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

**Doba použitelnosti:** Najmenej 24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

**Likvidácia:** Nepoužitý výrobok alebo prázdný obal so zvyškami odvadzajte v zberni nebezpečného odpadu! Znečistený obal po dôkladnom vyprázdení vycistite niekoľkokrát výplachom vody a po vycistení je možné ho odložiť do nádob na zber komunálneho odpadu.

**Dátum výroby:** Uvedený na obale.

**Číslo registrácie prípravku:** bio/2390/D/18/CCHLP



8 590517 009730 >