

Super OXI - přípravek pro komplexní dezinfekci bazénové vody

Vzhled a složení: Čirá bezbarvá kapalina, obsahuje peroxid vodíku (100 g/l), ES 231-765-0, a striebro (max. 0,4 g/l), ES 231-131-1.

Působení: Kyslikový prostředek pro ošetření bazénů na bázi peroxidu vodíku a stříbra. Ve vodě se rozkládá na vzniku vody a aktivního kyslíku. Voda ani kyslik nezataží životní prostředí. Po jeho aplikaci voda nepáchne, nedráždí oči, sliznice a kožu, což jsou značné výhody oproti ošetrování vody chlorovými přípravky.

Návod k použití a dávkování: Doporučená dávka 100 ml/m³ vody každých 5–8 dní. Touto dávkou se do vody vpráví cca 4,5 mg/l aktivního kyslíku. Jestliže má být ošetření bazénové vody účinné, musí být koncentrace aktivního kyslíku udržována v rozmezí 5–15 mg/l. Pro zjistění koncentrace aktivního kyslíku ve vodě se používají speciální testovací soupravy. Dávku pomalu vlijte do skimmeru z výšky max. 5 cm tak, aby nedošlo k rozstřikování kapek přípravku.

NEBEZPEČÍ: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lekárská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekurejte. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

Pokyny pro první pomoc: *Při nadýchaní:* Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch až do odeznení příznaků. *Při styku s kůží:* Začněte ihned oplavovat vodu a pokračujte po dobu 15 minut. Pokud dojde k podráždení, privolejte lekářskou pomoc. *Při zasažení očí:* Okamžitě vymýjte poudrem tečoucí vodu po dobu 15 minut. Vždy zajistěte lekářské ošetření. *Při požití:* NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! Dejte vypít 1–2 sklenice vody. Při potížích vyhledejte lekářskou pomoc. V případě problémů okamžitě volejte lekáře nebo TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293 nebo 224 915 402).

Skladování: Přípravek skladujte užávrem nahoru v původním odvzdušněném obalu na chladném větraném miestě chráněném před světlem a mrázem, oddělené od potravin, nápojů a krmiv, mimo dosah kyselin, redukčních činidel, zápalných a horlavých látok.

Upozornění: Uzávěr povolujte opatrně, uvnitř nádoby může být pretlak. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Poznámka: Samostatně používaný přípravek má ověřené algičidní účinky při dávkování 500 ml/1 m³ vody každých 5–8 dní.

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Obsah: 3 l

Likvidace: Nepoužitý výrobek nevylevíte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdějte ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vycistěte několikrát výplachem vody a po vyčistení je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uveden na obalu.

Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Informace o bazénové chemii najdete na www.marimex.cz.



11313109

2369.110718.04

Marimex CZ s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 Praha 4
Tel.: +420 261 222 111 • Email: info@marimex.cz
Největší internetový obchod s bazény www.marimex.cz

MARIMEX

www.marimex.cz
www.marimex.sk

Super OXI - prípravok pre komplexnú dezinfekciu bazénovej vody

Vzhľad a složenie: Číra bezfarebná kvapalina, obsahuje peroxid vodíku (100 g/l), ES 231-765-0, a striebro (max. 0,4 g/l), ES 231-131-1.

Pôsobenie: Kyslikový prostriedok na bázi peroxidu vodíka a striebra. Vo vode sa rozkladá na vodu a aktívny kyslik. Voda ani kyslik nezaťažujú životné prostredie. Po jeho aplikácii voda nepáchne, nedráždi oči, sliznicu a kožu, čo predstavuje značné výhody oproti ošetrovaniu vody chlórovými prípravkami.



Návod na použitie: Odporúčaná dávka je 100 ml/m³ vody každých 5–8 dní. Touto dávkou sa do vody dostaňte cca 4,5 mg/l aktivného kyslíka. Pokiaľ má byť ošetrované bazénové vody účinné, musí byť koncentrácia aktivného kyslíku udržiavaná v rozmedzí 5–15 mg/l. Pre zaistenie koncentrácie aktivného kyslíku vo vode sa používajú speciálne testovacie súpravy. Dávku pomaly vlejte do skimmera z výšky max. 5 cm tak, aby nedošlo k rozstreikovaniu kapek prípravku.

NEBEZPEČENSTVO: Škodlivý pri požití. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosah detí. Při používaní výrobku nedzte, nepite ani nefajčte. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

Predlekarška prvá pomoc: *Pri nadýchaní:* Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. *Pri styku s pokožkou:* Začnite oplavovať vodou a mydlem po dobu 15 minút. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. *Pri zasiahaní očí:* Začnite ihned vyplavovať prúdom tečoucej vody po dobu 15 minút. Zajistite lekárske ošetrenie. *Pri požití:* NEVYVOLÁVATE ZVRACANIE! Dejte ihned vypít 1–2 poháre vody. Ihned vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade problémov okamžite volajte lekára alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (2 5477 4166).

Skladovanie: Pripravok skladujte uzáverom hore v pôvodnom odvzdušnenom obale na chladnom vetraneom miestech chránenom pred svetlom a mrázom, oddelené od potravín, nápojov a krmív, mimo dosah kyselin, redukčných činidel, zápalných a horlavých látok.

Upozornenie: Uzávieru povolujte opatrné, vo vnútri nádoby môže byť pretlak. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Poznámka: Samostatne používaný prípravok má ověřené algičidní účinky při dávkování 500 ml/1 m³ vody každých 5–8 dní.

Doba použitelnosti: 24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržiavaní skladovacích podmienok.

Obsah: 3 l

Likvidácia: Nepoužitý výrobok nevylevíte do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo prázdný obal so zbytkami odovzdajte v zberne nebezpečneho odpadu! Znečistený obal po dôkladnom vyprázdnení vycistite niekoľkokrát výplachom vody a po vyčistení je možné ho odložiť do nádob pre zber komunálneho odpadu.

Datum výroby: Uvedený na obale.

Posúzenie VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Informácie o bazénovej chémii najdete na www.marimex.sk.

Cíl registrácie prípravku: bio/2389/D/18/CCHLP



8 590517 009808